



allesgute :) stada.de

FAXBESTELLUNG: 06101/603-380

Jetzt neu von STADA: Pantoprazol STADA®
Bestellen Sie jetzt Ihr persönliches Ärztemuster

Pantoprazol STADA®

- Wirkstärken:
20 mg, 40 mg msr. Tabletten
- In den Packungsgrößen:
14, 15, 28, 30, 56, 60, 98, 100
- Rabattverträge für
über 40 Mio. Versicherte



Bitte übersenden Sie mir kostenlos ein Ärztemuster Pantoprazol STADA® 20 mg nach AMG § 47 (3,4)

Praxisstempel und Unterschrift des Arztes

Bitte gut lesbar abstempeln.
(Angebot, solange Vorrat reicht)

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu Informationszwecken gespeichert werden. Diese Zustimmung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Nicht zutreffendes bitte streichen.

Pantoprazol STADA® 20 mg magensaftresistente Tabletten. Wirkstoff: Pantoprazol. Zus.: 1 msr. Tbl. enth. 20 mg Pantoprazol. Sonst. Bestandt.: Calciumstearat, Carmellose-Na, Crospovidon (Typ B), Maltitol, Na-carbonat; Macrogol 3350, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1)-Dispersion 30 %, Na-carbonat, Poly(vinylalkohol), entölte Phospholipide aus Sojabohnen, Talkum, Triethylcitrat, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E 172), Titandioxid (E 171). Anw.: Behandl. d. leicht. Refluxkrankh. u. damit verbund. Sympt., z.B. Sodb., saures Aufstoßen, Schluckbeschwerd. Zur Langzeitthera. u. -prävent. v. Rezid. b. Refluxösophag. Prävent. d. durch NSAR induz. gastroduod. Ulzera b. Risikopat., die e. kontinuierl. Behandl. mit NSAR bedürfen. Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkstoff, Soja, Erdnuss od. e. d. sonst. Bestandt. Komb. m. Atazanavir. Anw.-beschränk.: Schw. Leberfkt.stör. Leberenz. regelm. kontr. Bei Anstieg ggf. Behandl. abbrech. Ausschluss e. malignen Tumors. Langzeitther. regelm. überw. Kdr. <12 J. keine Erfahr. Hered. Fruktose-Intol. Schwangersch.: Nur m. Vorsicht. Stillz.: Nutzen-Risiko-Abwäg. NW: Leuko-/Thrombozytopenie. Anaphylakt. Reakt. einschl. anaphylakt. Schock. Depression, Halluzination, Desorientierung u. Verwirrung insbes. bei prädisponierten Pat. sowie e. Verschlecht. d. Sympt. bei vorbesteh. Symptomatik. Kopfschm. Schwindel, Sehstör. (wie Verschwommensehen). Oberbauchbeschwerden, Durchfall, Verstopfung, Blähungen. Übelkeit/ Erbrechen. Mundtrockenheit. Schwerer Leberzellschaden u. als Folge Gelbsucht m. od. ohne Leberversagen. Allerg. Reakt. wie Juckreiz u. Hautausschlag. Urtikaria, Angioödem, schw. Hautreakt. z.B. SJS, Erythema multiforme, Lyell-Syndrom, Photosensibilität. Arthralgie. Myalgie. Interstit. Nephritis. Gynäkomastie. Periph. Ödeme. Erh. Leberwerte (Transaminasen, γ-GT), erh. Triglyceride, erh. Körpertemperatur, Hypermatriämie b. ält. Pat. Hinw: Malabsorption v. Vit. B12. Geringfüg. erhöh. Risiko f. GI-Infekt. m. z.B. Salmonellen u. Campylobact. Bei besteh. Sympt. weit. Unters. Verkehrshinw. beachten! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig. STADApHarm GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel. Stand: März 2009

Pantoprazol STADA® 40 mg magensaftresistente Tabletten. Wirkstoff: Pantoprazol. Zus.: 1 msr. Tbl. enth. 40 mg Pantoprazol. Sonst. Bestandt.: Calciumstearat, Carmellose-Na, Crospovidon (Typ B), Maltitol, Na-carbonat; Macrogol 3350, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1)-Dispersion 30 %, Na-carbonat, Poly(vinylalkohol), entölte Phospholipide aus Sojabohnen, Talkum, Triethylcitrat, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E 172), Titandioxid (E 171). Anw.: Zwölffingerdarm-/Magengeschwür, mittelschw. u. schw. Formen d. Refluxösophagitis, Langzeitbehand. d. Zollinger-Ellison-Syndr. u. and. Erkr., die m. e. path. Hypersekretion v. Magensäure einhergehen. Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkstoff, Soja, Erdnuss od. e. d. sonst. Bestandt. Komb. m. Atazanavir. Anw.-beschränk.: Ausschluss e. malignen Tumors. Schw. Leberfkt.stör. Dos. angep.; Leberenz. regelm. kontr. Bei Anstieg ggf. Behandl. abbrech. Kdr. <12 J. keine Erfahr. Hered. Fruktose-Intol. Schwangersch.: Nur m. Vorsicht. Stillz.: Nutzen-Risiko-Abwäg. NW: Leuko-/Thrombozytopenie. Anaphylakt. Reakt. einschl. anaphylakt. Schock. Depression, Halluzination, Desorientierung u. Verwirrung insbes. bei prädisponierten Pat. sowie e. Verschlechterung d. Sympt. bei vorbesteh. Symptomatik. Kopfschmerzen. Schwindel, Sehstörungen (wie Verschwommensehen). Oberbauchbeschwerden, Durchfall, Verstopfung, Blähungen. Übelkeit/ Erbrechen. Mundtrockenheit. Schwerer Leberzellschaden u. als Folge Gelbsucht m. od. ohne Leberversagen. Allerg. Reakt. wie Juckreiz u. Hautausschlag. Urtikaria, Angioödem, schw. Hautreakt. z.B. SJS, Erythema multiforme, Lyell-Syndrom, Photosensibilität. Arthralgie. Myalgie. Interstit. Nephritis. Gynäkomastie. Periph. Ödeme. Erh. Leberwerte (Transaminasen, γ-GT), erh. Triglyceride, erh. Körpertemperatur, Hypermatriämie b. ält. Pat. Hinw: Malabsorption v. Vit. B12. Bei besteh. Sympt. > 4 Wochen weit. Unters. Geringfüg. erhöh. Risiko f. GI-Infekt. m. z.B. Salmonellen u. Campylobact. Verkehrshinw. beachten! Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig. STADApHarm GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel. Stand: März 2009



PANTOPRAZOL STADA®

TIEFPREIS

SICHERHEIT

NEU



TOP 3

STADA
Arzneimittel

TIEFPREIS-STRATEGIE*

* Dazu passen wir unsere Preise seit dem 1.1.2009 dynamisch an.

Ihre Vorteile!

- Tiefpreis: Überzeugen Sie sich!
www.stada.de/preisvergleich
- Regresse vermeiden
- Zuzahlungsbefreit verordnen**

** in den definierten Festbetragsgruppen.

STADA
Arzneimittel